

PROVA - ENFERMEIRO - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



1. São atribuições específicas do enfermeiro do programa Agentes Comunitários de Saúde:

- 1) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS.
- 2) Supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificação e educação permanente dos ACS, com vistas ao desempenho de suas funções.
- 3) Facilitar a relação entre os profissionais da Unidade Básica de Saúde e ACS, contribuindo para a organização da demanda referenciada.
- 4) Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ☐ É correta apenas a afirmativa 3.
- b. ☐ É correta apenas a afirmativa 4.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

2. São consideradas Doenças Sexualmente Transmissíveis:

1. Sífilis
2. Cancro Mole
3. Candidíase
4. Hepatite B
5. Corrimento

PROVA - ENFERMEIRO - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

3. A principal relevância da identificação e do controle da Hipertensão Arterial Sistêmica reside na redução das suas complicações. Identifique as possíveis complicações em decorrência da hipertensão:

- a) Doença cérebro-vascular, Doença arterial coronariana, Insuficiência cardíaca, Doença renal crônica, Doença arterial periférica.
- b) Doença cérebro-vascular, Doença arterial coronariana, Insuficiência cardíaca, Esclerose múltipla, Doença arterial periférica.
- c) Doença cérebro-vascular, Doença arterial coronariana, Diabetes , Doença renal crônica, Doença arterial periférica.
- d) Doença cérebro-vascular, Doença arterial coronariana, Insuficiência cardíaca, Doença renal crônica, Fibromialgia.

4. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria *Mycobacterium tuberculosis* ou Bacilo de Koch (BK), que afeta principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges. Identifique sua forma de transmissão:

PROVA - ENFERMEIRO - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



- a) A transmissão é direta, de pessoa a pessoa. O doente expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso e podem ser aspiradas por outro indivíduo, contaminando-o.
- b) A tuberculose é uma doença não contagiosa, causada por um micro-organismo, que se propaga através do ar, por meio de gotículas que contêm os bacilos expelidos por um doente com tuberculose (TB) pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz alta.
- c) A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um micro-organismo, que se transmite por transfusão de sangue e seus derivados.
- d) A transmissão é direta, de pessoa a pessoa. Pode ocorrer também por meio de roedores infectados. O doente expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso. No caso dos roedores, por meio dos dejetos.

5. São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica:

- 1. definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das equipes.
- 2. programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população, com a priorização de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência. Inclui-se aqui o planejamento e a organização da agenda de trabalho compartilhado de todos os profissionais e recomenda-se evitar a divisão de agenda segundo critérios de problemas de saúde, ciclos de vida, sexo e patologias dificultando o acesso dos usuários.
- 3. desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais alimentares e/ou ambientais com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis.

PROVA - ENFERMEIRO - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



4. realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências.

5. prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) Somente corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- b) Somente corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- c) Somente corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d) Somente corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

6. Analise o resultado da colpocitologia oncótica de uma mulher de 22 anos, hígida, nulípara, em uso e contracepção oral combinada:

☐ Adequabilidade da amostra: satisfatória.

☐ Epitélios representados na amostra: escamosos glandulares. ☐

- Microbiologia: Lactobacilos sp. ☐

- Alterações celulares benignas reativas ou reparativas: inflamação. ☐

- Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau.

De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o rastreamento o Câncer de Colo de Útero (011) qual a conduta preconizada diante do resultado dessa colpocitologia oncótica?

PROVA - ENFERMEIRO - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



- a) Repetir a coleta da colpocitologia oncótica em 6 meses.
- b) Referir ao serviço de urgência hospitalar.
- c) Referir ao ginecologista imediatamente.
- d) Encaminhar para exame colposcópico para biópsia e conização da lesão.

7. O câncer de mama e o câncer de colo uterino são os cânceres ginecológicos que mais matam mulheres no país. Entretanto durante toda sua via apenas metade das mulheres realiza pelo menos um exame preventivo de câncer de colo uterino e apenas um terço das mulheres serão submetidas a um único exame de mamografia. São fatores de risco para o câncer de mama:

- a) Amamentação e multiparidade.
- b) Ocorrência de mastite durante o puerpério.
- c) Sexo masculino e uso prolongado de DIU contendo progestágeno por mulheres em idade fértil.
- d) Sexo feminino, menarca precoce, nuliparidade e terapia de reposição hormonal.

8. Em relação aos exames solicitados durante a consulta de pré-natal de baixo risco, relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1 Exame

- 1. Coombs indireto
- 2 VDRL
- 3. HbsAg

PROVA - ENFERMEIRO - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



- 4. Anti-HIV
- 5. Rubéola IgG
- 6. Glicemia

Coluna 2 Indicação

- () Exame indicado para o diagnóstico e seguimento terapêutico de sífilis.
- () Detecta a presença de anticorpos específicos para rubéola na corrente sanguínea. Quando o resultado for reagente, indica imunidade adquirida por meio de vacinação ou exposição ao vírus.
- () Indicado para gestantes com tipagem sanguínea Rh negativo.
- () Exame solicitado para investigar hepatite
- () Exame que indica a dosagem sérica e glicose.
- () Exame que se destina ao diagnóstico e consequente profilaxia da Transmissão Vertical do vírus da imunodeficiência humana.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a. () 1, 3, 4, 5
- b. () 1, 4, 3, 5
- c. () 2, 5, 1, 3, 6, 4
- d. () 3, 4, 5, 1

9. A maioria dos métodos anticoncepcionais atua de forma a prevenir a gravidez antes ou durante a relação sexual. A anticoncepção de emergência (AE) um método anticonceptivo que pode evitar a gravidez após a relação sexual. O método, também conhecido por “pílula do dia seguinte”, utiliza compostos hormonais concentrados e por curto período de tempo, nos dias seguintes da relação sexual. Em relação a contracepção emergencial correto afirmar:

- a) pode ser utilizada e forma planejada previamente programada, substituindo outros métodos anticoncepcionais de rotina.
- b) atua após a fecundação e impede a implantação do óvulo fecundado no útero, sendo, por este motivo, considerado um método abortivo.
- c) Todas as mulheres podem usar o método com segurança, mesmo aquelas que, habitualmente, tenham contraindicações ao uso de anticoncepcionais hormonais combinados
- d) Sua utilização é recomendada em casos de relação sexual sem uso de método anticonceptivo, falha conhecida ou presumida do método em uso de rotina, uso inadequado do anticonceptivo e abuso sexual.

10. A visita domiciliar constitui-se em um instrumento de intervenção fundamental da Estratégia Saúde da Família. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Embora permita o reconhecimento dos recursos que a família dispõe, a visita domiciliar não facilita o planejamento da assistência.
- () Toda ida ao domicílio se caracteriza como uma visita domiciliar, sendo que a relação entre o profissional e o usuário deve estar pautada nos princípios do SUS.

PROVA - ENFERMEIRO - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



() A realização da visita domiciliar requer um profissional habilitado e com capacitação específica.

() A visita domiciliar compreende planejamento, execução, registro de dados e avaliação do processo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

A. () V – F – V – F

b. () V – F – F – V

C. () F – V – F – V

D. () F – F – V – V

11. Assinale a alternativa correta em relação à rede de frio.

a) São câmaras frias usadas para conservação de vacinas, incluindo o armazenamento e a manipulação desses produtos.

b) São câmaras frias usadas para conservação de vacinas que inclui o transporte, o armazenamento e a manipulação desses produtos.

c) São câmaras frias e freezers usados para conservação de vacinas, incluindo o armazenamento e a manipulação desses produtos.

d) É o sistema de conservação de imunobiológicos que inclui transporte, armazenamento e manipulação desses produtos.

12. A difteria é uma doença infecciosa imunoprevenível. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação a essa doença.

PROVA - ENFERMEIRO - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



- () A difteria é transmitida através de gotículas de secreção eliminadas através da tosse, espirro ou ao falar.
- () O portador crônico, não tratado, pode transmitir a difteria apenas durante o primeiro mês.
- () Após a ocorrência de um ou mais casos, deve-se vacinar todos os contatos não vacinados, inadequadamente vacinados ou com estado vacinal desconhecido.
- () Não há necessidade de isolamento do portador, mesmo que a cultura das secreções seja positiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – F
- b) V – F – V – F
- c) F – V – V – V
- d) F – V – V – F

13. Os sinais que evidenciam que uma criança está gravemente desidratada são:

- a) aumento da diurese, urina turva e com odor fétido, prostração, irritabilidade, pele seca.
- b) urina com odor fétido e volume diminuído, olhos fundos e encovados, hipotonia, língua seca.
- c) diminuição da diurese, pele úmida, hipotonia, olhos brilhantes e secos, língua saburrosa.

PROVA - ENFERMEIRO - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



d) diminuição da diurese, astenia, irritabilidade, pele seca, língua saburrosa, olhos fundos e encovados.

14. As queimaduras, dependendo da extensão e profundidade, podem ser tratadas em nível ambulatorial ou hospitalar. Os critérios para encaminhamento de crianças a uma Unidade de Queimados são determinados pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

Queimadura de espessura parcial superior a da superfície corporal em criança maior que 2 anos de idade ou em criança menor de 2 anos de idade; queimaduras de terceiro grau em da superfície corporal em criança de qualquer idade; queimaduras que envolvem face, mãos, pés, genitália, períneo e articulações importantes; queimaduras causadas por eletricidade, inclusive lesão por raio, queimaduras químicas e lesão por inalação.

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto.

- a) 5% ; 2% ; 1%
- b) 5% ; 3% ; 1%
- c) 10% ; 5% ; 2%
- d) 15% ; 5% ; 5%

15. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação ao dengue.

PROVA - ENFERMEIRO - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



- () A primeira manifestação é a febre alta (39 a 40°C) associada à cefaleia, artralgia, adinamia, dor retro-orbitária com presença ou não de exantema e/ou prurido.
- () O período de incubação é de 15 a 30 dias, sendo em média de 20 dias.
- () A sorologia é utilizada para a detecção dos anticorpos antidengue e pode ser solicitada a partir do 6o dia do aparecimento dos sintomas.
- () A prova do laço deve ser realizada em todos os casos suspeitos de dengue, durante o exame físico.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – V
- b) V – F – F – V
- c) V – F – F – F
- d) F – V – V – F

16. A gestante deve ser orientada sobre os sinais e sintomas de trabalho de parto durante o pré-natal. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras(V) e as falsas (F) em relação ao assunto:

- () A perda do tampão mucoso é um sinal de que iniciou o trabalho de parto.
- () As contrações de trabalho de parto verdadeiro cessam somente com a sedação.
- () O desconforto ou “dor” apenas no abdome é um sinal de falso trabalho de parto.
- () No verdadeiro trabalho de parto, as contrações são eficazes para apagarem e dilatarem progressivamente a cérvix uterina.

PROVA - ENFERMEIRO - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – F
- b) V – F – F – V
- c) F – F – V – V
- d) F – F – F – V

17. O profissional enfermeiro pode acompanhar inteiramente o pré-natal de baixo risco na rede básica de saúde, de acordo com o Ministério da Saúde e conforme garantido pela Lei do Exercício Profissional. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras(V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Toda mulher com história de atraso menstrual de mais de 15 dias deverá ser orientada a realizar o Teste Imunológico de Gravidez (TIG).
- () A percepção dos movimentos fetais (de 13 a 20 semanas) é um sinal de certeza de gravidez.
- () Gestantes com história anterior de recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo ou malformado, não podem ser acompanhadas na atenção básica.
- () Polidrâmnio ou oligidrâmnio são fatores de risco que podem indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco.
- () Até a 28ª semana de gestação as consultas de pré-natal devem ser realizadas mensalmente.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – F – V
- b) V – F – V – V – F

PROVA - ENFERMEIRO - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



c) V – F – F – V – V

d) F – V – F – V – F

18. Para a lavagem gástrica é necessária uma sondagem oro ou nasogástrica. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras(V) e as falsas (F) com relação a esse procedimento.

() Para estimar o comprimento da sonda, mede-se a distância entre o lóbulo da orelha, a ponta do nariz e o apêndice xifoide, coloca-se lidocaína gel na extremidade distal e na narina escolhida.

() Durante a colocação da sonda nasogástrica, o pescoço do paciente deve estar defletido para facilitar a passagem da mesma.

() Na lavagem gástrica para a retirada de substâncias tóxicas, a sondagem orogástrica é a mais indicada, pois permite o uso de sonda mais calibrosa.

() Para confirmar o posicionamento da sonda oro ou nasogástrica, insufla-se ar por meio de uma seringa ao mesmo tempo em que se ausculta a região epigástrica.

() Em adultos, uma lavagem gástrica bem sucedida necessita, em média, 2 litros de soro fisiológico ou de água.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

a) V • F • V • V • F

b) F • V • F • V • F

c) V • V • F • V • V

d) F • F • F • V • F

PROVA - ENFERMEIRO - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



19. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença que representa um dos maiores problemas em saúde pública no Brasil. Assim, é alto o número de atendimentos de usuários com elevações agudas do nível pressórico nas Unidades Básicas de Saúde. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Nas emergências hipertensivas ocorre progressiva lesão aguda de órgãos-alvo e risco iminente de morte, que necessitam de redução imediata da pressão arterial com agentes anti-hipertensivos parenterais.
- () Nos casos de urgência, a atuação sobre o controle pressórico deve ser realizada de forma menos intensa que nas emergências, podendo-se estabelecer esse controle em até 24h, com medicações por via oral.
- () Sintomas de crise hipertensiva são: cefaleia, alterações visuais, déficit neurológico, dor precordial e dispneia.
- () Nos casos de emergência e urgência hipertensiva, o paciente deve ser encaminhado para um serviço de urgência e emergência.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo:

- a) V • V • V • F
- b) V • V • F • F
- c) V • F • V • V
- d) F • V • V • F

PROVA - ENFERMEIRO - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



20. No edema agudo do pulmão (EAP), o fluxo aumentado de líquidos ultrapassa a capacidade de drenagem realizada pelos vasos linfáticos. A equipe de saúde da Atenção Primária deve estar atenta para o diagnóstico precoce e concomitante manejo clínico inicial.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:

1. O EAP é uma das principais formas clínicas da insuficiência cardíaca aguda, mas pode ter origem não cardiovascular.
2. O diagnóstico do EAP é principalmente realizado por meio de exame de raio X.
3. No exame físico, o quadro clínico geralmente é dramático, com o paciente apresentando taquipneia intensa, rubor, sudorese, uso de musculatura acessória, tosse com ou sem expectoração espumosa e rosada, além de cianose.
4. Na ausculta pulmonar são identificadas crepitações pulmonares difusas (desde as bases até os ápices), podendo ocorrer também sibilos e roncos.
5. No EAP pode ocorrer turgência jugular, edema de membros inferiores e de parede abdominal e hepatomegalia, dependendo do grau e tipo de insuficiência cardíaca congestiva.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- b) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.