

**PROVA MÉDICO ESPECIALISTA: GERIATRA**  
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**  
**EDITAL Nº 001/2017**



- 1. A demência mista consiste na associação das seguintes síndromes demenciais**
  - a. Doença de Alzheimer e Demência por corpúsculos de Levy
  - b. Doença de Alzheimer e Demência Semântica
  - c. Demência vascular e Doença de Alzheimer
  - d. Demência vascular e Demência por corpúsculos de Levy
  
- 2. Enquadram-se no grupo das demências reversíveis, exceto:**
  - a. Hipertireoidismo
  - b. Depressão
  - c. Pelagra
  - d. Deficiência de vitamina B12
  
- 3. São fatores de risco para osteoartrite, exceto**
  - a. História familiar de osteoartrite, particularmente de joelhos e mãos
  - b. Obesidade
  - c. Osteoporose
  - d. Hemocromatose
  
- 4. Qual o agente etiológico mais comum na infecção do trato urinário do idoso?**
  - a. Escherichia coli
  - b. Klebsiella sp.
  - c. Serratia sp.
  - d. Enterobacterias

**PROVA MÉDICO ESPECIALISTA: GERIATRA**  
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**  
**EDITAL Nº 001/2017**



**5. Em relação ao Mini Exame do Estado Mental (MEEM) é correto afirmar**

- a. O MEEM é constituído de duas partes: uma abrange orientação, memória e atenção, com pontuação máxima de 21 pontos; a outra aborda habilidades específicas como nomear e compreender, com pontuação máxima de 9 pontos, totalizando um escore de 30 pontos
- b. Os pontos de cortes utilizados independem da escolaridade do examinado
- c. Um dos testes consiste em desenhar dois hexágonos sobrepostos.
- d. Considera-se normal uma pontuação acima de 24, devendo este valor ser corrigido para a escolaridade e idade.

**6. Em relação aos fármacos utilizados para o tratamento da Doença de Alzheimer, pertencem à classe dos inibidores da colinesterase, exceto:**

- a. Tacrina
- b. Donepezila
- c. Rivastigmina
- d. Memantina

**7. Considerando as síndromes demenciais abaixo:**

I – Doença de Alzheimer

II – Demência semântica

III – Demência de corpúsculos de Levy

IV – Doença de Pick

V – Demência associada à doença do neurônio motor (esclerose lateral amiotrófica).

São incluídas no grupo das demências frontotemporais

- a. III, IV e V
- b. II, III e IV
- c. I, II e V

**PROVA MÉDICO ESPECIALISTA: GERIATRA**  
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**  
**EDITAL Nº 001/2017**



d. II, IV e V

**8. A incontinência urinária é definida pela perda involuntária de urina. Sua prevalência aumenta com a idade. São medicamentos que podem ser utilizados no tratamento da incontinência urinária, exceto:**

- a. Oxibutinina
- b. Duloxetina
- c. Clortalidona
- d. Solifenacina

**9. Referente às características clínicas da demência com corpos de Lewy, assinale a alternativa correta:**

- a. O pico de incidência é aos 60 anos.
- b. As alucinações auditivas tendem a ser complexas e detalhadas, envolvendo, por exemplo, figuras humanas ou objetos animados.
- c. O comprometimento da memória é precoce e pode ocorrer já nos estágios iniciais da doença.
- d. As alterações de comportamento com desinibição sexual são frequentes.

**10. Em relação ao tratamento do delirium é correto afirmar:**

- a. A contenção física é a primeira medida a ser instituída
- b. O agente de escolha para o tratamento é o Haloperidol, o qual deve ser administrado inicialmente por via oral, com a dose titulada conforme a resposta do paciente.
- c. O agente de escolha para o tratamento é a classe dos benzodiazepínicos, devido seu efeito rápido, o que reduz significativamente complicações decorrentes do quadro.
- d. Deve-se iniciar medicações usadas no tratamento da Doença de Alzheimer, como a Memantina, o mais precoce possível, a fim de reduzir o tempo dos sintomas.

**PROVA MÉDICO ESPECIALISTA: GERIATRA**  
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**  
**EDITAL Nº 001/2017**



**11. Mulher, 75 anos, há 6 meses com quadro de anorexia, emagrecimento, febre baixa, cefaleia, claudicação da mandíbula, diplopia, dor em musculatura de pescoço, ombros e cintura pélvica. Exames laboratoriais revelam anemia normocítica e normocrômica e VHS de 88mm (1ª hora). Nesse caso, o diagnóstico mais provável é:**

- a. Polimiosite
- b. Depressão
- c. Fibromialgia
- d. Arterite de células gigantes

**12. Quanto à incontinência urinária, assinale a alternativa correta**

- a. A imipramina é a droga de primeira escolha no tratamento medicamentoso na incontinência urinária de urgência na mulher idosa
- b. Na incontinência urinária do tipo de urgência, a paciente relata ausência do desejo para urinar.
- c. A incontinência de esforço é mais comum entre as mulheres idosas do que nas mulheres jovens.
- d. Os antipsicóticos podem afetar a continência urinária.

**13. Dentre as opções abaixo**

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| I – Incapacidade cognitiva   | V - Imobilidade                |
| II - Iatrogenia              | VI – Incapacidade comunicativa |
| III – Incontinência urinária | VII – Insuficiência familiar   |
| IV – Estabilidade postural   |                                |

Quais são consideradas síndromes geriátricas:

- a. I, III, IV, V, VI
- b. II, III, IV, V, VI

- c. I, II, III, IV, V, VI
- d. I, II, III, V, VI, VII

**14. Quedas em idosos constituem um problema de saúde pública e de grande impacto social tendo em vista o progressivo envelhecimento populacional.**

**Sobre a prevenção de quedas é correto afirmar:**

- a. Ajustes medicamentosos, como uso controlado de anti-hipertensivos e medicamentos psicoativos (benzodiazepínicos, neurolépticos) e prescrição de diuréticos no período noturno são medidas que reduzem o risco de queda.
- b. Um programa de exercícios físicos que trabalhe a força muscular e o equilíbrio é capaz de reduzir o risco de quedas.
- c. Os fatores a serem evitados são: caminhar em superfícies escorregadias, tapetes soltos ou com dobras, degraus altos ou estreitos, obstáculos no caminho, ausência de corrimãos em corredores e banheiros, sapatos inadequados, iluminação inadequada.
- d. A correção visual é um fator importante a ser considerado.

**15. Homem, 80 anos, com diagnóstico de demência de Alzheimer moderada, evoluindo com apatia e períodos de agitação noturna. Faz uso de Donepezila 10mg por dia. Das opções terapêuticas abaixo, qual a melhor, diante do caso, para sintomas comportamentais:**

- a. Iniciar Metilfenidato
- b. Iniciar neurolépticos a noite
- c. Iniciar um inibidor seletivo da recaptação de serotonina
- d. Associar memantina, até atingir a dose plena

**PROVA MÉDICO ESPECIALISTA: GERIATRA**  
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**  
**EDITAL Nº 001/2017**



**16. Em relação ao tratamento do Transtorno depressivo na pessoa idosa, assinale a alternativa correta.**

- a. Os antidepressivos tricíclicos são seguros e não apresentam reações adversas em idosos.
- b. A depressão no idoso não responde ao tratamento de psicoterapia analítica, devido ao déficit cognitivo causado pela depressão.
- c. Os antidepressivos inibidores seletivos da receptação da serotonina apresentam melhor tolerância pelos idosos e menos efeitos colaterais.
- d. A eletroconvulsoterapia, apesar de eficaz, não demonstra segurança na aplicação em idosos.

**17. A avaliação geriátrica ampla (AGA) analisa o paciente idoso em vários domínios, incluindo o domínio físico, mental, social, funcional e ambiental. São utilizados instrumentos capazes de detectar sinais de demência, delirium, depressão, efeitos colaterais medicamentosos, fragilidade, déficits visuais e auditivos etc., bem como as grandes síndromes geriátricas e perda do equilíbrio e da capacidade funcional. Com relação a AGA, é incorreto afirmar:**

- a. Permite uma avaliação de riscos e possibilidades no estado nutricional
- b. Identificação de risco de iatrogenias não faz parte do objetivo da AGA
- c. Determina o grau e a extensão da incapacidade (motora, mental, psíquica).
- d. Serve de orientação para mudanças e adaptações no ambiente em que o idoso vive.

**18. O escore isquêmico de Hachinski é o questionário mais comumente utilizado para o diagnóstico de demência vascular. O ponto de corte que favorece o diagnóstico da demência arteriopática é:**

- a. 3
- b. 5
- c. 7
- d. 9

**19. São características da depressão do idoso, exceto:**

- a. Humor deprimido com menor frequência e intensidade
- b. Sintomas relacionados à ansiedade
- c. Sonolência excessiva
- d. Retardo psicomotor

**20. A administração de medicamentos através da via subcutânea é conhecida como hipodermóclise e está em concordância com os princípios dos cuidados paliativos. Em relação à hipodermóclise é incorreto afirmar:**

- a. Permite a infusão de grandes volumes de solução salina (até 2 litros).
- b. O acesso pode ser mantido por até 7 dias.
- c. Medicações como Diazepam, Clorpromazina e a grande maioria dos antibióticos podem ser aplicados com segurança.
- d. Pode ser utilizada para a infusão contínua de medicamentos e soluções.