

PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



- 1. A via de administração e dose para as vacinas dT, BCG e VTV, respectivamente são:**
 - a) intramuscular 0,5ml; subcutânea 0,1ml; subcutânea 0,5 ml
 - b) subcutânea 0,5ml; subcutânea 0,1ml; intramuscular 0,5ml
 - c) intramuscular 0,5ml; intradérmica 0,1ml; subcutânea 0,5ml
 - d) intramuscular 0,5ml; intradérmica 0,1ml; subcutânea 0,1ml

- 2. A prescrição de insulina na Atenção Básica exige que a equipe domine os ajustes de dose em cada tipo de esquema, a técnica de preparação, aplicação e armazenamento. Em relação a administração de insulina, é correto afirmar, EXCETO:**
 - a) A aplicação subcutânea pode ser realizada nos braços, abdômen, coxas e nádegas. A velocidade de absorção varia conforme o local de aplicação, sendo mais rápida no abdômen, intermediária nos braços e mais lenta nas coxas e nádegas.
 - b) A via de administração usual da insulina é a via subcutânea, mas a insulina regular também pode ser aplicada por via intramuscular, sendo absolutamente contra indicada por via intravenosa.
 - c) Não é necessário puxar o êmbolo para verificar a presença de sangue.
 - d) É importante mudar sistematicamente o local de aplicação de insulina de modo a prevenir a ocorrência de lipodistrofia.

- 3. A notificação compulsória tem sido a principal fonte da vigilância epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o processo informação-decisão-ação. Considerando as disposições a respeito da notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, analise as afirmativas abaixo:**

PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



I. Notificação compulsória negativa consiste na comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória;

II. A notificação compulsória é obrigatória para os médicos e facultativa para os demais profissionais da equipe.

III. A notificação compulsória imediata (NCI) deve ser realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível;

IV. São doenças de notificação compulsória: sífilis congênita, rubéola congênita, pielonefrite aguda, hepatites virais.

Assinale a alternativa correta

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II, e IV estão corretas
- c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas
- d) Somente as afirmativas I e III estão corretas

4. Sobre a administração de oxigênio (O₂) por cateter nasal, é CORRETO afirmar que:

- a) A medida do cateter é a distância que vai da ponta do nariz ao lóbulo da orelha, mais 2 cm.
- b) A água destilada, utilizada para umidificação deverá ser completada sempre que necessário.
- c) Os umidificadores deverão ser trocados a cada 48 horas, obrigatoriamente
- d) O oxigênio deve ser administrado sempre umidificado para prevenir o ressecamento das vias aéreas e das secreções.

PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



5. Em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança. São sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência, as afirmativas são corretas, EXCETO:

- a) Cianose generalizada ou palidez importante, icterícia visível abaixo do umbigo ou nas primeiras 24 horas de vida, gemidos, fontanela (moleira) abaulada;
- b) Frequência cardíaca acima de 100bpm, respiração abaixo de 40mrpm e temperatura entre 35,5° C e 37,5° C.
- c) Secreção purulenta do ouvido, umbigo hiperemiado e/ou com secreção purulenta, pústulas na pele (muitas e extensas), irritabilidade ou dor à manipulação.
- d) Para crianças com mais de 2 (dois) meses, é importante observar se a criança não consegue beber ou mamar no peito, se vomita tudo o que ingere, se apresenta convulsões ou se está letárgica ou inconsciente.

6. O exame Papanicolau é um exame realizado para detectar alterações nas células do colo do útero. Em relação ao exame, as alternativas estão corretas EXCETO:

- a) Para garantir um resultado correto, a mulher não deve ter relações sexuais (mesmo com camisinha) nos dois dias anteriores ao exame, evitar também o uso de duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais nas 48 horas anteriores à realização do exame.
- b) É importante que a mulher não esteja menstruada, porque a presença de sangue pode alterar o resultado
- c) Mulheres grávidas não podem se submeter ao exame, pois o mesmo pode acarretar prejuízo para sua saúde ou a do bebê.
- d) Toda mulher com vida sexual ativa deve submeter-se ao exame preventivo periódico, especialmente as que têm entre 25 e 59 anos. O exame deve ser feito

PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



anualmente, e após dois exames consecutivos (com um intervalo de um ano) apresentando resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada três anos.

- 7. Paciente de sexo masculino chega a unidade de saúde deambulando com apoio, para realizar curativo em incisão cirúrgica em perna esquerda, consequente a fratura. Em relação a esse procedimento e as condutas do técnico de enfermagem, analise as alternativas abaixo:**

- I. Em ferida cirúrgica observar a incisão quanto as características das bordas, presença de hiperemia, edema, calor, ou dor local, presença de secreção, integridade dos pontos e aspecto da pele.
- II. Realizar com auxílio de pinça a limpeza da incisão cirúrgica em sentido único, utilizando as duas faces da gaze (sem movimento de vaivém) trocando as gazes sempre que necessário.
- III. A utilização de luvas estéreis nessa situação está indicada para proteger o profissional de contaminação.
- IV. Após o procedimento, recolher o material, retirar as luvas, higienizar as mãos e realizar as devidas anotações de enfermagem.

Assinale a alternativa correta

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II, e IV estão corretas
- c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas
- d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas

- 8. Sobre a administração de medicação parenteral é correto afirmar que:**

- a) A angulação da agulha nas vias subcutânea, intramuscular e intravenosa respectivamente são 15°, 45° e 90°
- b) Na região dorso glútea, o volume máximo a ser administrado é 10 ml.

PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



- c) A região ventro glúteo ou Hoschtetter é o musculo de primeira escolha para via intramuscular.
- d) O membro a ser puncionado deve ser garroteado mais ou menos 10 a 15 cm acima do local da inserção da agulha.

9. No Brasil, a tuberculose é um sério problema da saúde pública. Analise as afirmações:

- I. São atribuições do Técnico de Enfermagem em relação às atividades com paciente portador: Receber o resultado da baciloscopia de acompanhamento do tratamento, encaminhar o material coletado ao laboratório, orientar a coleta do escarro, prescrever quimioprofilaxia para os comunicantes.
- II. A transmissão é aérea e ocorre a partir de aerossóis expelidos pela tosse, espirro ou fala de doentes com tuberculose pulmonar ou laríngea
- III. Na TB pulmonar, o principal sintoma é a tosse (seca ou produtiva). A recomendação é que todo sintomático respiratório seja investigado para a tuberculose.
- IV. Logo nas primeiras semanas de tratamento o paciente se sente melhor e, por isso, precisa ser orientado pelo profissional de saúde a realizar o tratamento até o final, independente da melhora dos sintomas. É importante lembrar que tratamento irregular pode complicar a doença e resultar no desenvolvimento de cepas resistentes aos fármacos.

Assinale a alternativa correta:

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II, e IV estão corretas
- c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas
- d) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas

PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



10. Sobre a hanseníase, assinale a alternativa correta.

- a) A hanseníase apresenta longo período de incubação, em média de 5 a 12 anos.
- b) É transmitida principalmente pelas vias respiratórias superiores de pacientes multibacilares não tratados.
- c) É uma doença infectocontagiosa aguda.
- d) O agente infeccioso é o *Mycobacterium bovis*

11. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Assinale a alternativa que não se inclui nesse grupo:

- a) Doença inflamatória pélvica, tricomoniase, HPV
- b) Linfagranuloma venéreo, cancro mole, donovanose
- c) Herpes labial, gardnerela, candidíase
- d) Hepatites virais, herpes genital, gonorreia

12. Um rapaz de 18 anos chega a unidade básica de saúde com mordedura canina em panturrilha direita. O cachorro é do vizinho e está preso. Qual a conduta correta do técnico de enfermagem?

- a) Deixar o rapaz aguardando para atendimento médico.
- b) Fazer higiene local com água e sabão, irrigar com soro fisiológico 0,9%, verificar cartão de vacina, preencher ficha de notificação e encaminhar para avaliação médica.
- c) Administra analgésico, orienta a higiene do ferimento e solicita que retorne no outro dia para atendimento médico.
- d) Administrar uma dose de vacina anti-rábica e solicitar que retorne em 10 dias para avaliação.

PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



13. Um técnico de enfermagem recebe prescrição para administrar uma medicação parenteral, mas não está seguro em relação a via e local de administração, mesmo assim realiza o procedimento, utilizando agulha maior do que a indicada para a via, causando danos ao paciente. Esse profissional cometeu:

- a) Imperícia
- b) Imprudencia
- c) Displencia
- d) Negligencia

14. Na receita médica está prescrito 200mg de um medicamento, porem na unidade há ampolas com 500mg/2ml. Quantos ml deverá ser administrado?

- a) 1,5 ml
- b) 0,6 ml
- c) 1,25 ml
- d) 0,8 ml

15. A lavagem das mãos é, sem dúvida, a rotina mais simples, mais eficaz, e de maior importância na prevenção e controle da disseminação de infecções. Sobre esse procedimento, é correto afirmar:

- a) Deve ser realizado somente no início e fim de cada turno de trabalho.
- b) Corresponde à retirada de sujidade, microrganismos e outras substâncias das mãos, antes e após qualquer procedimento.
- c) A utilização de luvas dispensa o procedimento.
- d) É recomendado o uso coletivo de toalhas de tecido, pois, diferente da toalha de papel, previnem o ressecamento da pele.

16. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem. Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é PROIBIDO:

- a) Disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica e sociedade em geral.
- b) Resguardar os princípios da honestidade, veracidade e fidedignidade no conteúdo e na forma publicitária.
- c) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.
- d) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.

17. A asma é uma doença inflamatória crônica, multifatorial determinada pela interação de fatores genéticos e ambientais. É objetivo do tratamento, EXCETO:

- a) Controlar os sintomas e prevenir limitação crônica ao fluxo aéreo
- b) Permitir realização de atividades cotidianas
- c) Maximizar efeitos adversos dos medicamentos
- d) Manter a melhor função pulmonar possível

18. São doenças que conferem imunidade permanente:

- a) Hepatite B, tétano, caxumba
- b) Tétano, sarampo, rubéola
- c) H1N1, febre amarela e tuberculose
- d) Sarampo, caxumba e rubéola

PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017



19. No uso de sondagem gástrica ou enteral para paciente domiciliar, a equipe de saúde deve acompanhar e prestar orientações aos pacientes, familiares e cuidadores. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Cuidados com a fixação, pois retrações pode levar ao deslocamento e causar posicionamento incorreto.
- b) Após o banho seca-la e trocar a fixação (nasogástrica, nasoentérica) da face, devendo estar sempre limpa e seca.
- c) Para administração de dieta, infusões de líquidos medicamentos posicionar o paciente sentado ou, manter cabeceira elevada em no mínimo 30 graus. Após esse procedimento sempre lavar a sonda com água filtrada.
- d) O técnico de enfermagem deve realizar a troca da sonda a cada 7 (sete) dias.

20. As recomendações da Organização Mundial de Saúde relativas à amamentação são as seguintes, EXCETO:

- a) O aleitamento materno deve ser exclusivo até o sexto mês de vida.
- b) Manter o aleitamento materno exclusivo até o terceiro mês de idade e complementar com leite em pó até o sexto mês.
- c) Manter o aleitamento até os 2 anos de idade.
- d) O termo aleitamento materno exclusivo significa a não utilização de outros leites, chás, água e alimentos.