

PROVA OBJETIVA

**CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
MAQUEIRO**

01) O paciente a ser transportado necessita de suporte ventilatório, pois está com as funções respiratórias comprometidas. Nesse caso, para transportá-lo, haverá necessidade que se tenha disponível um:

- A) colar cervical.
- B) esfigmomanômetro.
- C)ambu.**
- D) estetoscópio.

02) No transporte de um homem de 60 anos, sua esposa falou com o maqueiro que estava muito reocupada que seu marido se contaminasse nos lençóis que cobrem o colchonete da maca, pois viu que antes dele outro paciente havia sido transportado. Nesse caso, esta senhora deve ser orientada de que:

- A) os lençóis são grandes e a cada transporte eles são virados, de maneira que a parte que serviu ao paciente anterior fique para baixo.
- B) nesse caso, não há problema usar os mesmos lençóis, pois o paciente anterior não tinha doença contagiosa.
- C) a cada transporte os lençóis são trocados.**
- D) a cada transporte a equipe aplica uma solução desinfetante nos lençóis.

03) No transporte dos pacientes o maqueiro entra em contato com o próprio paciente e com tudo o que o envolve, incluindo-se roupas, equipos de soro etc. Se o maqueiro não tomar as medidas de biossegurança adequadas, corre o risco de que ele possa contribuir para:

- A) infecção cruzada.**
- B) infecção dupla.
- C) infecção de transporte.
- D) infecção leve.

04) Sobre a lavagem das mãos, assinale a alternativa errada:

A) as mãos devem ser lavadas com água e sabonete antes e após o contato com qualquer paciente.

B) a higienização das mãos pode ser feita por fricção com álcool a 70%, se as mãos não estiverem visivelmente sujas, antes e após o contato com qualquer paciente.

C) se o maqueiro tiver contato com sangue deve lavar as mãos com água e sabonete.

D) no caso de usar luvas o maqueiro não precisa lavar as mãos após retirá-las.

05) O maqueiro tem acesso a informações básicas sobre o paciente que está sob seus cuidados, mas isso não significa que ele deva divulgar estas informações. Guardar consigo as informações sobre um paciente chama-se:

- A) egoísmo profissional.
- B) sigilo profissional.**
- C) educação profissional.
- D) gentileza profissional.

06) No atendimento do paciente em home care, ao fazer a transferência do paciente da cadeira de rodas para o leito, os conhecimentos de mecânica corporal que devem ser aplicados são, EXCETO:

- A) aumentar a base de suporte afastando os pés a uma distância confortável para realizar o movimento.
- B) flexionar os joelhos e os quadris, mantendo a coluna ereta ajudam a suportar o peso do paciente e facilita o movimento.
- C) alinhar o corpo para estabilizar o centro de gravidade mantém o equilíbrio.
- D) rolar, girar ou virar em torno do eixo requer mais esforço do que levantar.**

<p>07) No transporte de um paciente em cadeira de rodas, os cuidados com a segurança são fundamentais, por isso:</p> <p>A) não se deve descer rampas com pacientes em cadeiras de rodas. B) as travas só devem ser usadas no caso do paciente estar inconsciente. C) se o paciente estiver bem, ele mesmo pode movimentar a cadeira de rodas e conduzir o seu transporte. D) ao descer rampas, a cadeira de rodas deve ser transportada de ré.</p> <p>08) Durante o transporte, o paciente comunica ao maqueiro que está com náusea, salivando e que vai vomitar. O cuidado que deve ser feito é:</p> <p>A) se não houver contraindicação, elevar a cabeça da maca e providenciar uma cuba-rim. B) mantê-lo na mesma posição e acelerar a velocidade para chegar logo no local de destino. C) retirá-lo da maca e levá-lo caminhando com cuidado. D) dar água gelada para passar a náusea.</p> <p>09) Ao passar o paciente da cama hospitalar para a maca, o maqueiro observa que o medicamento instalado no paciente parou de gotejar e que há sangue no equipo, próximo à inserção do cateter intravenoso. Nesse caso, a conduta adequada que ele deve tomar é:</p> <p>A) fechar a torneira de gotejamento, desconectar o equipo do cateter intravenoso e transportar o paciente para o local de destino o mais rápido possível para que lá a situação seja resolvida. B) abrir mais a torneira de gotejamento para que o sangue retorne para dentro do vaso e se restabeleça a infusão. C) fechar a torneira de gotejamento, manter tudo conectado, colocar o frasco do medicamento em cima do abdômen do paciente para não correr o risco de o medicamento gotejar e transportar o paciente para o local de destino para que lá a situação seja resolvida. D) tranquilizar o paciente e solicitar a presença da enfermeira do setor.</p>	<p>10) No transporte por maca de um paciente que tem problemas respiratórios, a posição indicada é a de:</p> <p>(A) trendelenburg. (B) fowler. (C) sims. (D) decúbito dorsal ou supino.</p> <p>11) O transporte da vítima pode ser feito por maca, que é a melhor forma. Se por acaso não houver uma disponível no local, ela pode ser improvisada com duas camisas ou um paletó e dois bastões resistentes, ou até mesmo enrolando-se um cobertor várias vezes em uma tábua larga. No caso de só existir um socorrista no local, os procedimentos corretos são, EXCETO:</p> <p>A) Apoio lateral simples: o braço da vítima é passado sobre os ombros do socorrista, por trás do pescoço; o socorrista segura firmemente o braço da vítima; com o outro braço, o socorrista envolve o acidentado por trás da cintura. B) Arrastamento de roupa — a vítima é arrastada no sentido do eixo cranial pelo socorrista, que utiliza a camisa ou casaco como ponto de apoio. C) Apoio Corporal — Coloque a vítima no colo ou no ombro, dependendo do peso da mesma, não esquecendo que o fator tempo trabalha contra você. D) Arrastamento tipo cobertor — posicione a vítima estendida de lado. Coloque o cobertor por debaixo do corpo do paciente, desvire-o, colocando-o de barriga para cima, e puxe o cobertor do outro lado. Inicie o transporte puxando o cobertor próximo à cabeça da vítima.</p>
---	---

<p>12) A remoção ou movimentação de um acidentado deve ser feita com o máximo de cuidado, a fim de não agravar as lesões existentes. Aponte a providência INCORRETA tomada antes da remoção da vítima.</p>	<p>14) A troca dos lençóis da maca deve ser realizada com a seguinte frequência:</p>
<p>A) Se houver suspeita de fraturas no pescoço e nas costas, evite mover a pessoa. Para puxá-la para um local seguro, mova-a de costas, no sentido do comprimento com o auxílio de um casaco ou cobertor.</p> <p>B) Apoie sempre a cabeça, impedindo-a de cair para trás.</p> <p>C) Se houver parada respiratória, inicie imediatamente a respiração boca-a-boca e faça massagem cardíaca. Imobilize todos os pontos suspeitos de fratura.</p> <p>D) Se houver suspeita de fraturas, amarre os pés do acidentado e o erga em posição vertical levando até a sua maca. No caso de uma pessoa inconsciente, mas sem evidência de fraturas, uma pessoa basta para o levantamento e o transporte rápido.</p>	<p>A) No final do dia.</p> <p>B) No final de semana.</p> <p>C) Após cada três passageiros transportados.</p> <p>D) Após o transporte de cada paciente.</p> <p>15) É um Conjunto de técnicas aplicadas para prevenir a contaminação por microrganismos. Ela permite manter um ser vivo ou um meio inerte, isento de bactérias. Denomina-se:</p> <p>A) Esterilização.</p> <p>B) Assepsia.</p> <p>C) Limpeza rigorosa.</p> <p>D) Desinfecção</p> <p>16) Durante o seu turno de trabalho o Maqueiro deverá:</p> <p>A) Auxiliar os enfermeiros em sua função.</p> <p>B) Realizar o reparo e a manutenção de seu equipamento de trabalho.</p> <p>C) Fazer a condução dos pacientes entre os diversos setores do hospital.</p> <p>D) auxiliar o preenchimento de ficha de admissão dos pacientes.</p>
<p>13) A adesão às práticas corretas de higienização das mãos pelos profissionais é uma das questões fundamentais para o controle de infecções. A higienização das mãos para quem trabalha com saúde é um cuidado de:</p> <p>A) Esterilização.</p> <p>B) Exigência do paciente.</p> <p>C) Aparência pessoal.</p> <p>D) EPI</p>	

<p>17) Se ao retirar o paciente do leito, for verificado sintomas como tontura, fraqueza e hipotensão, o maqueiro DEVE:</p> <p>A) Colocar o paciente de volta no leito e notificar.</p> <p>B) Continuar o procedimento e evitar interrupções.</p> <p>C) Ter calma e no final do turno registrar a ocorrência.</p> <p>D) Pedir para um outro profissional realizar o transporte.</p>	<p>Solicitar o auxílio de outra pessoa se necessário, colocar os pés do paciente no descanso.</p> <p>D) Cobri-lo com um lençol e colocar um travesseiro no encosto, se assim o paciente desejar.</p>
<p>18) São cuidados que devemos ter no transporte de pacientes na maca que estão impossibilitados de movimentar-se, EXCETO:</p> <p>A) Usar o lençol móvel ou lençol de baixo, enrolar o lençol lateralmente, de ambos os lados, até aproximar do paciente;</p> <p>B) Posicionar a maca encostada na cama, segurar com firmeza e pedir para o paciente passar na posição semi-sentado ou deslizando o corpo até a maca.</p> <p>C) Encostar a maca no leito, dispor o pessoal ao lado da cama e ao lado da maca, e em movimentos simultâneos levantar o lençol com o paciente e colocar sobre a maca;</p> <p>D) Prender o lençol sobre o coxim, cobrir o paciente e observá-lo durante o transporte.</p>	<p>20) Ao realizar o transporte de um paciente com Tuberculose Pulmonar, o maqueiro deve usar os seguintes equipamentos de proteção individual:</p> <p>A) capote e luvas.</p> <p>B) luva e máscara.</p> <p>C) máscara e óculos.</p> <p>D) capote e máscara.</p>
<p>19) É a maneira correta de transportar pacientes em uma Cadeira de rodas, EXCETO:</p> <p>A) Forrar a cadeira de rodas com um lençol.</p> <p>B) Colocar a cadeira de rodas destravadas e com descanso dos pés, lateralmente a cama.</p> <p>C) Auxiliar o paciente a passar do leito para escadinha e desta para a cadeira de rodas.</p>	